

	<p>सफेद मख्खी(White Fly)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रभावित पत्ते मुड़ और सूख जाते हैं। 2. पौधे छोटे रह जाते हैं। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. पाक्षिक (15 दिन के) अंतराल पर (0.02%) मोनोक्रोटोफॉस या फोस्फोमिडान (0.02%) या असिटामैप्रिड (1/2 ग्राम पर 1 लिटर) के साथ छिड़काव।
	<p>मौजेक (Mosaic)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रभावित पत्ते सिकुड़ जाते हैं। 2. प्रभावित पौधे की छोटी पत्तिया आम तौर पर विकृत और सामान्य की तुलना में छोटे हैं। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग मुक्त स्वस्थ पौधों से बीज बोन के लिए चुना जाना चाहिए। 2. बीज की बुवाई से पहले बीज को टराइसोडीयम फोस्फेट (90 ग्राम / 1 लीटर पानी) में भिगोर।
	<p>मरोडियापण्कुघक / रोग (Tomato leaf curl)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. पत्तियों प्रभावित रूप से छोटी रह जाती हैं और नीचे की तरफ झुक जाती हैं। 2. नए उभरते पत्ते थोड़े पीले रखा के होते हैं। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. सफेद मख्खी जनसङ्ख्या की जाँच , बीमारी की घटनाओंको कम कर सकते हैं। 2. दानेदार कीटनाशक फ्युराडान (Furadan) (1 किलो ai / हेक्टेयर) नर्सरी बिस्तर में बीज बोन के समय whitefly जनसङ्ख्या जाहता है। 3. पाक्षिक अंतराल पर (0.02%) मोनोक्रोटोफॉस या फोस्फोमिडोन (0.02%) के साथ छिड़काव।